

レジメン名

GEM+CDDP (患者限定)※

出典

Oral Oncology 97 (2019)37-43
N Engl J Med 2019;381:1124-35.
改定第6版がん薬物療法レジメンハンドブック
ジェムザール適正使用ガイド

実施部署区分

☐入院 ☐外来 ☐処置

対象疾患

上咽頭がん

☒導入療法☐進行・再発☐補助療法(術前・術後)

※GEMに上咽頭がんの適応なし。倫理委員会にて承認済み。承認番号:20240017

投与減量の基準

CGr	30mL/min以上45mL/min以下	CDDP:50%減量
	45mL/minを超えるかつ80mL/min以下	CDDP:25%減量
その他		

投与中止の基準

ANC	1000/mm ³ 未満	PLT	5万/mm ³ 未満
AST,ALT	200IU/L以上	Hb	8.0g/dL未満
CGr	30mL/min未満	T-bil	3.0mg/dL以上
その他	出典には中止基準設けられていないため、Cor以外はGrade3以上の有害事象である上記の値で登録した。		

1クール期間 21日

総クール数 3コース

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%糖液100mL	30分	d1, 8
シスプラチン	80mg/m ²	生食250mL	2時間	d1

1日投与順 (経時的にプレメディケーション・ポストメディケーション、溶解液まで含む)
day1) ①ソルデム1 500mL/60min ②ソルデム3A 500mL+硫酸マグネシウム 20mL/60min ③アロキシ点滴静注バッグ0.75mg+デキサート 9.9mg/15min ④ゲムシタビン1000mg/m ² +5%糖液100ml (30分) ⑤マンニット(500)250mL/30min ⑥シスプラチン80mg/m ² +生食 計500mL/2hr ⑦ソルデム1 500mL/60min day8) ①デキサート6.6mg+生食100mL (15分) ②ゲムシタビン1000mg/m ² +5%糖液100ml (30分) ③生食50ml (フラッシュ用) day1-3)内服 アプレビタントカプセル(125-80-80) day2-3)内服 デカドロン8mg