

レジメン名

VP

出典

British M J,1969,2,662-665.
臨床血液 1388-1393,1984.

実施部署区分

☒入院 ☐外来 ☐処置

対象疾患

ALL寛解導入療法

☐進行・再発
☐補助療法(術前・術後)
☒初発

投与減量の基準

T-Bil	1.5mg/dLを超える	AST	60IU/Lを超える
その他	上記の減量基準に該当する場合、オンコピンを50%減量する		

投与中止の基準

T-Bil	3.0mg/dLを超える	AST	180IU/Lを超える
その他			

1クール期間 28日

総クール数 1クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ビンクリスチン(オンコピン)	1.4mg/m ² (上限2mg)	輸液100mL	30分	d1、8、15、22
プレドニゾン	60mg/m ²	経口又は点滴		d1-28

1日投与順 (経時的にプレデイクेशन・ポストデイクेशन、 溶解液まで含む)
Day1,8,15,22) ①生食50mL(ルート確保用) ②オンコピン1.4mg/m ² +生食100mL(30分) ③生食50mL(フラッシュ用) <内服又は点滴> Day1-28) プレドニン 60mg/m ²