

レジメン名

A+AVD

出典 アドセトリス適正使用ガイド

実施部署区分

■入院

■外来

□処置

対象疾患

未治療のCD30陽性のホジキンリンパ腫

□進行・再発

□補助療法(術前・術後)

■初発

□

投与減量の基準

その他	Grade2の末梢神経障害において、回復後0.9mg/kgに減量して投与継続する Grade3の末梢神経障害において、回復後0.9mg/kgに減量して投与再開する		

1クール期間

28日

総クール数

6クール

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

ANC	1000/mm ³ 未満		
その他	Grade3の末梢神経障害		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ブレンツキシマブ ベドチン(アドセトリス)	1.2mg/kg	輸液100mL	30分	d1、15
ダカルバジン	375mg/m ²	AQ10mL/Vで溶解 輸液100mLに希釈	30分	d1、15
ドキソルビシン	25mg/m ²	輸液適量 計100mL	30分	d1、15
ビンブラスチン(エクザール)	6mg/m ² (上限10mg)	輸液100mL	30分	d1、15

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、
溶解液まで含む)

day1、15
①アロキシ0.75mg＋デキサート9.9mg(15-30min)
②ダカルバジン375mg/m²＋注射用水10mL/V＋
輸液100mL(30min)※
※点滴経路全般を遮光
③ドキソルビシン25mg/m²＋輸液適量(30min)
④エクザール6mg/m²＋輸液100mL(30min)
⑤生食50mL(フラッシュ用)
⑥ボララミン5mg＋アセリオ(1000)500mg(15-
30min)
⑦アドセトリス1.2mg/kg＋注射用水10.5mL/V(溶
解)＋輸液100mL(30分)
⑧生食50mL(フラッシュ用)

<内服>
day1-3
アプレビタントカプセル(125-80-80)
day1は化学療法開始1時間前、day2,3は朝食後

下記は主治医の判断で追加可能
day1-4
オランザピン(5)1T1X夕食後
(糖尿病は禁忌、高齢者は2.5mgへ減量を考慮す
るなど慎重に投与)

day2-4
デカドロン8mg