レジメン名

Amrubicin

出典　J Clin Oncol. 2008;26(33):5401-6.
J Clin Oncol. 2011;29(3):287-93.
Lung Cancer. 2014;84(1):67-72.

実施部署区分

■入院　■外来　□処置

対象疾患

小細胞肺がん
■進行・再発 □補助療法（術前・術後） □ □

投与減量の基準

PLT	5万/mm3未満		
その他	WBC　1000/mm3未満またはANC　500/mm3未満が4日以上持続 発熱を伴うANC　1000/mm3未満への減少 いずれかの基準を満たすとき5mg/m2/日減量		

投与中止の基準

WBC	3000/mm3未満	PLT	10万/mm3未満
ANC	1500/mm3未満		
その他			

1クール期間　21日
（次のクールまでの標準期間）

総クール数　PDまで

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度（時間）	投与日(d1、d8等)
アムルビシン（カルセド）	40mg/m2	NS50mL	5-15分	d1-3

1日投与順
（経時的にﾌﾟﾚﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ・ﾎﾟｽﾄﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ、溶解液まで含む）

day1-3
①ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3mgﾊﾞｯｸﾞ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg（15-30分）
②ｶﾙｾﾄﾞ40mg/m2＋生食50mL（5-15分）
③生食50mL（フラッシュ用）