

レジメン名

Atezolizumab

出典 テセントリク適正使用ガイド 2018年4月作成

実施部署区分

☒ 入院
 ☐ 外来
 ☐ 処置

対象疾患

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

☒ 進行・再発☐ 補助療法(術前・術後)☐☐

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

AST	120IU/L以上※	ALT	120IU/L以上※
T-bil	1.8mg/dL以上※		
その他	※5日を超えて継続する場合 Grade2の肺臓炎、Grade2又は3の大腸炎、Grade3以上の高血糖、1型糖尿病、Grade3以上のアミラーゼまたはリパーゼ高値、Grade3の皮膚障害、Grade2の神経障害		

1クール期間 21日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
アテゾリズマブ(テセントリク)	1200mg	NS250mL	60分※	day1
※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。				

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、
溶解液まで含む)

day1

①生食50mL (ルート確保用)

②テセントリク1200mg＋生食250mL (60分※)
0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用

③生食50mL(フラッシュ用)