

レジメン名

weekly CDDP (CCRT)
short hydration出典 J Clin Oncol. 2022 Jun 20;40(18):1980-1990.
JCOG1008試験

実施部署区分

☒ 入院 ☐ 外来 ☐ 処置

対象疾患

頭頸部がん(扁平上皮癌)

☐ 進行・再発☒ 補助療法(術前・術後)☐ 初発

投与減量の基準

CCr	30mL/min以上45mL/min以下	CDDP:50%減量
	45mL/minを超えるかつ80mL/min以下	CDDP:25%減量
その他	下記の場合、CDDP 30mg/m ² →中止 悪心・嘔吐:Grade4 神経毒性:Grade2以上	

投与中止の基準

CCr	30mL/min未満		
その他	Grade3以上の神経毒性		

投与減量・中止基準について出典に記載がないため、医師と協議の上、子宮頸がんレジメンを参考に作成。

1クール期間 7日

総クール数 7コース

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
【化学放射線療法】				
シスプラチン	40mg/m ²	生食計500mL	60分	d1
放射線照射	2Gy/日	Total 66Gy		d1- 週5回

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、
溶解液まで含む)

<内服>
day1-3
アプレピタントカプセル(125-80-80)
day1は化学療法開始1時間前、day2,3は朝食後
day2-4
デカドロン8mg
day1-4
オランザピン5mg 夕食後
(糖尿病は禁忌、高齢者は2.5mgへ減量を考慮する
など慎重に投与)

<DIV>
day1
①ソルデム1 500mL/60min
②ソルデム3A 500mL+硫酸マグネシウム
20mL/60min
③パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg+デキ
サート9.9mg/15min
④マンニット(500)250mL/30min
⑤シスプラチン40mg/m²+生食 計500mL/60min
⑥ソルデム1 500mL/60min