

レジメン名

CDDP (CCRT)

出典 NEJM 2004;350:1937-44.
NEJM 2004;350:1945-52.
NEJM 2003;349:2091-8.

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

頭頸部がん

■根治的
局所進行切除不能、咽頭温存希望
■術後補助
再発高リスク、局所進行性

投与減量の基準

CGr	40mL/min以上50mL/min以下	CDDP:25%減量
その他	下記の場合、CDDPを40%減量 神経毒性の出現	

1クール期間

63日

総クール数

1コース

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準(シスプラチン)

ANC	1000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満
CGr	40mL/min未満		
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1, d8等)
【化学放射線療法】				
シスプラチン	100mg/m ²	生食 計500mL	120min	d1、22、43
放射線照射	2Gy/日	根治的：合計66~70Gy 術後：50~66Gy		d1- 週5回

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、溶解液まで含む)
<p><内服> day1-3,22-24,43-45 アプレピタントカプセル(125-80-80) day1は化学療法開始1時間前、day2,3は朝食後 day1-4,22-25,43-46 オランザピン5mg 夕食後 (糖尿病は禁忌、高齢者は2.5mgへ減量を考慮するなど慎重に投与)</p> <p><DIV> day1,22,43 ①ソルデム1 500mL/120min ②ソルデム3A 500mL+硫酸マグネシウム 20mL/120min ③パロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg+デキサート 9.9mg/15min ④マンニト(500)250mL/30min ⑤シスプラチン100mg/m²+生食 計500mL/120min ⑥ソルデム1 500mL/60min ⑦ソルデム1 500mL/60min ⑧ソルデム1 500mL/60min ⑨ソルデム3A 500mL/60min</p> <p>day2-3,23-24,44-45 ①デキサート6.6mg+NS 50mL/15min ②ソルデム1 500mL/120min ③ソルデム1 500mL/120min ④ソルデム3A 500mL/120min</p> <p>day4,25,46 ①デキサート6.6mg+NS 50mL/15min</p>