

レジメン名

GDDP+VP-16

出典 J Clin Oncol.20(14):3054-60(2002)

実施部署区分

 入院
 外来
 処置

対象疾患

限局型小細胞肺癌

 進行・再発

 補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

ANC	500/mm ³ 未満	PLT	2.5万/mm ³ 未満
Hb	7.0g/dL未満		
上記該当の場合、次コースのエトポシドを前コースの75%とする。			

投与中止の基準

WBC	3000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満
		CLcr	60mL/min未満*
その他	※GDDPを50%減量		

1クール期間 21-28日

総クール数 4クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
エトポシド	100mg/m ²	輸液500mL	120分	d1-3
シスプラチン	80mg/m ²	輸液適量 計500mL	120分	d1

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①アロキソ0.75mg/kg+デキサト9.9mg (15min) ②エトポシド100mg/m ² +輸液500mL (2hr) DEHPフリーの点滴セットを用いて投与 ③硫酸マグネシウム4mL+ソルテム3A500mL (60min) ④マンニトール250mL (30min) ⑤シスプラチン80/m ² +輸液適量計500mL (2hr) ⑥硫酸マグネシウム4mL+ソルテム3A500mL (60min)
day2-3 ①デキサト6.6mg+生食50mL(15min) ②ラステット100mg/m ² +輸液500mL (2hr) DEHPフリーの点滴セットを用いて投与 ③生食50mL(フラッシュ)
<内服薬> day1 アブレヒタントカプセル125mg抗がん剤投与60-90分前 day2-3 アブレヒタントカプセル80mg