

レジメン名

CPT-11

出典 NCCNガイドライン2016, ver.2  
カンプト適正使用ガイド  
J Clin Oncol 26:2311-2319.

## 実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

大腸癌

進行・再発  
補助療法(術前・術後)  
  

## 投与減量の基準

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| WBC | 2000/mm <sup>3</sup> 未満                     |  |  |
|     |   |  |  |
| その他 | 上記基準または下痢が認められた場合、回復を確認後、次回投与時20-25%減量にて再開。 |  |  |

## 投与中止の基準

|     |  |     |                          |
|-----|--|-----|--------------------------|
| WBC | 3000/mm <sup>3</sup> 未満  | PLT | 7.5万/mm <sup>3</sup> 未満※ |
|     |  |     |                          |
| その他 | ※適正使用ガイドでは10万/mm <sup>3</sup> だが、制限が厳しいためGrade2の血液毒性として上記の値で登録 |     |                          |

1コース期間 28日

総コース数 PDまで

(次のコースまでの標準期間)

| 薬剤名・略号 | 1日投与量                | 投与方法    | 投与速度(時間) | 投与日(d1, d8等) |
|--------|----------------------|---------|----------|--------------|
| イリノテカン | 150mg/m <sup>2</sup> | 輸液250mL | 90分      | day1, 15     |
|        |                      |         |          |              |
|        |                      |         |          |              |
|        |                      |         |          |              |
|        |                      |         |          |              |
|        |                      |         |          |              |
|        |                      |         |          |              |
|        |                      |         |          |              |
|        |                      |         |          |              |
|        |                      |         |          |              |
|        |                      |         |          |              |

| 1日投与順<br>(経時的にプレメーション・ポストメーション、<br>溶解液まで含む)   |
|---|
| day1<br>①生食50mL ルート確認用  |
| ②アロキシ0.75mg/バッグ+デキサート6.6mg<br>(15分)   |
| ③イリノテカン150mg/m <sup>2</sup> +輸液250mL<br>(90分)   |
| ④生食50mL (フラッシュ)   |
| <内服><br>day1から4日間<br>ウルソデオキシコール酸(100)3錠 分3毎食<br>後<br>炭酸水素ナトリウム 1.8g 分3毎食<br>後<br>(遅発性下痢の予防目的) |