

レジメン名

CTX+PSL

出典 ジェブタナ適正使用ガイド2020年2月作成

実施部署区分

☒入院
☒外来
☐処置

対象疾患

去勢抵抗性前立腺癌

☒進行・再発

☐補助療法(術前・術後)

☐
☐

投与減量の基準

|         |                                                                                                   |       |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| ANC     | 1000/mm <sup>3</sup> 未満が一週間以上持続                                                                   |       |              |
| Plt     | 2.5万/mm <sup>3</sup> 未満                                                                           |       |              |
| AST,ALT | 60IU/Lを超える                                                                                        | T-Bil | 1.8mg/dLを超える |
| その他     | 発熱性好中球減少症又は好中球減少症感染<br>下痢: Grade3以上<br>末梢性ニューロパシー: Grade2<br>上記基準を満たしたら20mg/m <sup>2</sup> へ減量→中止 |       |              |

投与中止の基準

|         |                                                              |       |              |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| ANC     | 1000/mm <sup>3</sup> 未満が一週間以上持続(1500/mm <sup>3</sup> を超えるまで) |       |              |
| Plt     | 2.5万/mm <sup>3</sup> 未満(7.5万/mm <sup>3</sup> に回復するまで)        |       |              |
| AST,ALT | 60IU/Lを超える                                                   | T-Bil | 1.8mg/dLを超える |
| その他     | 下痢: Grade3以上<br>末梢性ニューロパシー: Grade3以上<br>発熱性好中球減少症又は好中球減少症感染  |       |              |

1クール期間 21日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

| 薬剤名・略号                                                                                                                                                                    | 1日投与量               | 投与方法                  | 投与速度<br>(時間) | 投与日(d1、d8等)                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| カバジタキセル(ジェブタナ®)                                                                                                                                                           | 25mg/m <sup>2</sup> | 輸液250mL <sup>※1</sup> | 1時間          | day1                        |
| プレドニゾン                                                                                                                                                                    | 10mg/day            | 分2                    |              | 連日                          |
| ペグフィルグラステム(ジースタ®) <sup>※2</sup>                                                                                                                                           | 3.6mg               | 皮下注                   |              | day2以降(カバジタキセル投与終了24時間を超える) |
| ※1 点滴用溶液の最終濃度は0.10～0.26mg/mLにする。<br>カバジタキセル投与量<25mg: 輸液100mL<br>カバジタキセル投与量>65mg: 輸液500mL                                                                                  |                     |                       |              |                             |
| ※2 以下のような発熱性好中球減少症リスク因子を有する患者においては、G-CSF製剤での予防投与(一次予防)を考慮。<br>・65歳以上の高齢者<br>・Performance Statusが不良の患者<br>・発熱性好中球減少症の既往歴のある患者<br>・広範囲放射線照射等の強い前治療歴を有する患者<br>・腫瘍の骨髄浸潤を有する患者 |                     |                       |              |                             |
|                                                                                                                                                                           |                     |                       |              |                             |
|                                                                                                                                                                           |                     |                       |              |                             |

| 1日投与順<br>(経時的にプレメディケーション・ポストメディケーション、溶解液まで含む)                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| day1)DIV<br>①デキサート6.6mg+ホウラン5mg+ファモチジン20mg+生食100mL (30分)<br><br>②ジェブタナ25mg/m <sup>2</sup> +輸液250mL <sup>※1</sup> (60分)<br>0.2又は0.22μmのインラインフィルターを用いて投与<br><br>③生食50mL(全開)<br><br>連日<br>①プレドニン(5) 2錠 分2朝食後<br><br>day2)s.c.<br>ジースタ皮下注 3.6mg <sup>※2</sup> |