

レジメン名

DCS療法

出典 Cancer Chemother Pharmacol.80(4):707-713,2017
Cancer Chemother Pharmacol.69(2):407-413,2012

実施部署区分

☐入院 ☐外来 ☐処置

対象疾患

胃癌

☒進行・再発☐補助療法(術前・術後)☐☐

投与減量の基準

WBC	1000/mm ³ 未満	PLT	5万/mm ³ 未満
ANC	500/mm ³ 未満	Cr	1.5mg/dL以上
AST(GOT)	200IU/L以上	ALT(GPT)	200IU/L以上
その他			

投与中止の基準

ANC	1500/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
Cr	1.2mg/dL以上	T-bil	1.5mg/dL以上
AST(GOT)	100IU/L以上 ※	ALT(GPT)	100IU/L以上 ※
その他	※肝転移を有する場合はAST/ALT:200IU/L以上		

1クール期間 28日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

CDDPIは最長6コース
7コース目以降は
DOC+S-1で継続

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ティーエスワン	80mg/m ² ※	朝、夕食後		d1タ-15朝
シスプラチン	60mg/m ²	NS500mL	2時間	d1
ドセタキセル	40mg/m ²	NS250mL	1時間	d1
	※体表面積ごとで初回基準量を決める			
	1.25m ² 未満:40mg/回			
	1.25m ² 以上~1.5m ² 未満:50mg/回			
	1.5m ² 以上:60mg/回			

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
<<1-6コース>> day1 ①ソルデム1 500mL+硫酸Mg注10mEq+KCL注10mEq(2時間) ①パロセトロンパック0.75mg+デキサート9.9mg(15分) ②ソルデム1 500mL(2時間) ③ドセタキセル40mg/m ² +生食250mL(1時間) ④マシットT15% 400mL(1時間) ⑤シスプラチン 60mg/m ² +生食(500)400mL(2時間) ⑥ソルデム1 500mL+KCL注10mEq (2時間) ⑦ソルデム1 500mL (2時間) 内服 day1タ-15朝 TS-1 80mg/m ² ※ 分2で服用 day1-3 アプレビタントカプセル(125-80-80) day1は化学療法開始1時間前、day2,3は朝食後 day2-4 デカドロン8mg day1-4 オランザピン5mg 夕食後 (糖尿病は禁忌、高齢者は2.5mgへ減量を考慮するなど慎重に投与) <<維持療法>> day1 ①デキサート6.6mg+生食100mL(15分) ②ドセタキセル40mg/m ² +生食250mL(1時間) ③生食50mL(全開) 内服 day1タ-15朝 TS-1 80mg/m ² ※ 分2で服用 day2-3 デカドロン8mg(浮腫予防)