

レジメン名

DCS療法

出典 Cancer Chemother Pharmacol.80(4):707-713,2017
Cancer Chemother Pharmacol.69(2):407-413,2012

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

胃癌

進行・再発

補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

WBC	1000/mm ³ 未満	PLT	5万/mm ³ 未満
ANC	500/mm ³ 未満	Cr	1.5mg/dL以上
AST(GOT)	200IU/L以上	ALT(GPT)	200IU/L以上
その他			

1クール期間

28日

総クール数

PDまで

(次のクールまでの標準期間)

CDDPIは最長6コース
7コース目以降は
DOC+S-1で継続

投与中止の基準

ANC	1500/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
Cr	1.2mg/dL以上	T-bil	1.5mg/dL以上
AST(GOT)	100IU/L以上※	ALT(GPT)	100IU/L以上※
その他	※肝転移を有する場合はAST/ALT:200IU/L以上		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ティーエスワン	80mg/m ² ※	朝、夕食後		d1夕-15朝
シスプラチン	60mg/m ²	NS500mL	2時間	d1
ドセタキセル	40mg/m ²	NS250mL	1時間	d1
	※体表面積ごとで初回基準量を決める			
	1.25m ² 未満: 40mg/回			
	1.25m ² 以上~1.5m ² 未満: 50mg/回			
	1.5m ² 以上: 60mg/回			

1日投与順 (経時的にブレメタキセロン・ホストメタキセロン、 溶解液まで含む)
day1
①ソルテム1 500mL+硫酸Mg注10mEq+KCL注10mEq (2時間)
①' アロキシハック0.75mg+テキサート9.9mg (15分)
②ソルテム1 500mL (2時間)
③トセタキセル40mg/m ² +生食250mL (1時間)
④マンニトT15% 400mL (1時間)
⑤シスプラチン 60mg/m ² +生食(500)400mL(2時間)
⑥ソルテム1 500mL+KCL注10mEq (2時間)
⑦ソルテム1 500mL (2時間)
day2
①テキサート3.3mg+生食100mL (15分)
day3
①テキサート3.3mg+生食100mL (15分)
《内服》
day1夕-15朝
TS-1 80mg/m ² 分2で服用
day1-3
アプレピタントカプセルセット
day1-7
オランザピン2.5mg 2錠 分1