

レジメン名

DTX+PSL

出典 N Engl J Med 2004;351:1502-12.

実施部署区分

☐入院 ☒外来 ☐処置

対象疾患

去勢抵抗性前立腺癌

☒進行・再発☐補助療法(術前・術後)☐☐

投与減量の基準

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

投与中止の基準

|         |                          |       |            |
|---------|--------------------------|-------|------------|
| ANC     | 1000/mm <sup>3</sup> 未満※ | Hb    | 8.0g/dL未満※ |
| Plt     | 7.5万/mm <sup>3</sup> 未満※ | T-bil | 1.3mg/dL以上 |
| AST,ALT | 100IU/L以上※               |       |            |
| その他     | ※出典の値では制限が厳しいため上記の値で登録   |       |            |

1クール期間 21日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

| 薬剤名・略号 | 1日投与量               | 投与方法    | 投与速度<br>(時間) | 投与日(d1、d8等) |
|--------|---------------------|---------|--------------|-------------|
| ドセタキセル | 75mg/m <sup>2</sup> | 輸液250mL | 1時間          | day1        |
| プレドニゾン | 10mg/day            | 分2      |              | 連日          |
|        |                     |         |              |             |
|        |                     |         |              |             |
|        |                     |         |              |             |
|        |                     |         |              |             |
|        |                     |         |              |             |
|        |                     |         |              |             |
|        |                     |         |              |             |
|        |                     |         |              |             |
|        |                     |         |              |             |

1日投与順  
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、  
溶解液まで含む)

day1

①デキサート9.9mg＋ホラミン5mg＋生食100mL  
(30分)②ドセタキセル75mg/m<sup>2</sup>＋輸液250mL (60分)

③生食50mL(全開)

連日

①プレドニン(5) 2錠 分2朝夕食後