

レジメン名

DTX

出典 JCO 2000;18.2354-2362

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	--	-----------------------------

対象疾患

非小細胞肺癌
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発
<input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後)
<input type="checkbox"/>
基本は2nd line以降だが、高齢者やPS不良例はその限りではない。

投与減量の基準

その他			

1クール期間 21日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

WBC	3000/mm ³ 未満	Plt	7.5万/mm ³ 未満※
ANC	1500/mm ³ 未満※	T-bil	1.2mg/dL以上
AST,ALT	60IU/L以上		
その他	※出典ではPlt 10万/mm ³ 未満、ANC 2000/mm ³ 未満だが、制限が厳しいためGrade2の血液毒性として上記の値で登録		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ドセタキセル	60mg/m ²	NS250mL	60分	d1

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①グラニセロン3mgハック+テキサト6.6mg(15-30min) ②ドセタキセル60mg/m ² +生食250mL(60min) ③生食50mL(フラッシュ用)