

レジメン名

Encorafenib+Binimetinib+Cmab

出典 N Engl J Med. 2019; 381(17): 1632-1643
アービタックス®適正使用ガイド2021年6月
ピラフトビ®/メクトビ®適正使用ガイド2021年12月

実施部署区分

■入院 ■外来 □処置

対象疾患

BRAF V600E変異陽性 大腸癌
■進行・再発
□補助療法(術前・術後)
□初発
□

1クール期間

28日

総クール数

PD

(次のクールまでの標準期間)

投与量の基準(ピラフトビ・メクトビ)

Table with columns for clinical signs (網膜炎, ぶどう膜炎, etc.), severity (Grade 1-3), and management instructions (e.g., 21日以内に回復後、1段階減量して再開).

減量基準(アービタックス)

Table detailing infusion reaction and skin toxicity management, including infusion rate reduction (10mg/min to 5mg/min) and skin toxicity treatment steps.

投与中止の基準(アービタックス)

Table listing criteria for treatment discontinuation, such as Grade 3 skin toxicity or infusion reactions.

投与中止の基準(ピラフトビ・メクトビ)

Table listing criteria for treatment discontinuation, including Grade 1+ ocular inflammation and Grade 2+ skin toxicity.

Table with columns: 薬剤名・略号, 1日投与量, 投与方法, 投与速度(時間), 投与日(d1, d8等). Includes detailed notes on skin toxicity prevention and management.

Table detailing 1日投与順 (daily administration order) for 1 and 2 cycles, including food intake and medication timing.