レジメン名

Nivolumab(q4w)

出典　オプジーボ適正使用ガイド単剤療法版2021年12月作成

実施部署区分

■入院　■外来　□処置

対象疾患

がん化学療法後に増悪した
治癒切除不能な進行・再発食道癌

■進行・再発
□補助療法（術前・術後）
□
□

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

AST	120IU/Lを超える	ALT	120IU/Lを超える
T-bil	1.8mg/dLを超える		
Cr	6.48(女性は4.8)mg/dLを超えるかつベースライン値の1.5倍超		
その他	Grade1以上の肺臓炎、 Grade2以上の下痢・大腸炎・神経毒性・心筋炎、 Grade3以上の発疹、 症候性の甲状腺機能低下症・甲状腺中毒・下垂体障害・副腎障害、1型糖尿病、副腎クリーゼの疑い		

1クール期間　28日
（次のクールまでの標準期間）

総クール数　PDまで

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度（時間）	投与日(d1、d8等)
ニボルマブ（オプジーボ）	480mg/body	輸液100mL	30分	day1

1日投与順
（経時的にﾌﾟﾚﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ・ﾎﾟｽﾄﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ、溶解液まで含む）

day1
①生食50mL（ルート確保用）

②オプジーボ480mg/body＋輸液100mL
ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを用いて投与　（30分）

③生食50mL（フラッシ用）