

レジメン名

weekly PTX

出典

Cancer Chemother Pharmacol (2011) 67:1265-1272

実施部署区分

☒入院 ☒外来 ☐処置

対象疾患

切除不能・再発食道がん

☒進行・再発
☐補助療法(術前・術後)
☐初発
☐

投与減量の基準

WBC	1000/mm ³ 未満		
ANC	500/mm ³ 未満		
PLT	2万/mm ³ 未満		
その他	grade3以上の非血液毒性 grade2以上の神経障害、関節痛、筋肉痛 発熱性好中球減少症 20mg/m ² ずつ減量、最小用量60mg/m ²		

1クール期間 49日

(次のクールまでの標準期間)

総クール数 PDまで

投与中止の基準 day1

WBC	3000/mm ³ 未満		
ANC	1500/mm ³ 未満		
その他			

投与中止の基準 day8.15.22.29.36

WBC	2000/mm ³ 未満		
ANC	1000/mm ³ 未満		
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
パクリタキセル	100mg/m ²	NS250ml	60分	d1.8.15.22.29.36

1日投与順 (経時的にプレメディケーション・ポストメディケーション、 溶解液まで含む)
day1.8.15.22.29.36 ①ファモチジン20mg+デキサート6.6mg+ボララ ミン5mg+生食100mL(30min) ②パクリタキセル100mg/m ² +生食250mL(60min) DEHPフリーのインラインフィルターを用いて投与 ③生食50mL(フラッシュ用)