

レジメン名

FTD/TPI+bevacizumab

出典 C-TASK FORCE試験
ロンサーフ 適正使用のお願い

実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

結腸・直腸癌

進行・再発
補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

ANC	500/mm ³ 未満	PLT	5万/mm ³ 未満
その他	ロンサーフは本剤投与再開時において、コース単位で1日単位数として10mg/日単位で減量する。ただし、最低投与量は30mg/dayまでとする。		

投与中止の基準

ANC	1000/mm ³ 未満	PLT	5.0万/mm ³ 未満
Cr	1.5mg/dL以上	Hb	7g/dL未満
AST, ALT	100IU/L以上※	T-bil	2mg/dL以上
その他	※肝転移症例では200IU/L以上 Grade3以上の高血圧、Grade4以上の蛋白尿		

1クール期間 28日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ベバシズマブ	5mg/kg	NS100mL	初回90分※	day1, 15
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩(ロンサーフ)	35mg/m ² /回※	朝夕食後		day1-5, day8-12
※初回90分で忍容性が良好であれば2回目60分、3回目以降は30分まで投与時間の短縮可能				
	※体表面積ごとで初回基準量を決める			
	1.07m ² 未満:35mg/回(70mg/日)			
	1.07m ² 以上~1.23m ² 未満:40mg/回(80mg/日)			
	1.23m ² 以上~1.38m ² 未満:45mg/回(90mg/日)			
	1.38m ² 以上~1.53m ² 未満:50mg/回(100mg/日)			
	1.53m ² 以上~1.69m ² 未満:55mg/回(110mg/日)			
	1.69m ² 以上~1.84m ² 未満:60mg/回(120mg/日)			
	1.84m ² 以上~1.99m ² 未満:65mg/回(130mg/日)			
	1.99m ² 以上~2.15m ² 未満:70mg/回(140mg/日)			
	2.15m ² 以上:75mg/回(150mg/日)			

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1, 15 ①生食50mL (ルート確保用)
②ベバシズマブ7.5mg/kg+生食100mL(90分※) (2回目60分、3回目以降30分まで短縮可)
③生食50mL(フラッシュ用)
day1-5 ロンサーフ 35mg/m ² /回 1日2回朝夕食後 day8-12 ロンサーフ 35mg/m ² /回 1日2回朝夕食後