

レジメン名

GEM+CDDP療法

出典 N Engl J Med 2010;362:1273-1281  
Br J Cancer 2010; 103:469-474  
ジェムザール適正使用ガイド

実施部署区分

■入院 ■外来 □処置

診療科部長 清水 晶平

対象疾患

胆道がん

■進行・再発  
□補助療法(術前・術後)  
□  
□

| 項目                                          | ゲムシタビン                    | シスプラチン |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------|
| グレード4 (500/mm <sup>3</sup> 未満) の好中球数減少      | 1000→800mg/m <sup>2</sup> | 変更なし   |
| 2万/mm <sup>3</sup> 未満の血小板数減少または血小板輸血の実施     | 1000→800mg/m <sup>2</sup> | 変更なし   |
| 実施医療機関の基準値上限の10倍を超えるAST (GOT) /ALT (GPT) 上昇 | 1000→800mg/m <sup>2</sup> | 変更なし   |
| 実施医療機関の基準値上限の1.5倍を超える血清クレアチニン上昇             | 変更なし                      | 休業     |

1クール期間 21日  
(次のクールまでの標準期間)

総クール数 PDまで

| 薬剤名・略号 | 1日投与量                 | 投与方法      | 投与速度<br>(時間) | 投与日(d1、d8等) |
|--------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|
| シスプラチン | 25mg/m <sup>2</sup>   | NS500mL   | 90分          | day1、8      |
| ゲムシタビン | 1000mg/m <sup>2</sup> | 5%糖液100mL | 30分          | day1、8      |
|        |                       |           |              |             |
|        |                       |           |              |             |
|        |                       |           |              |             |
|        |                       |           |              |             |
|        |                       |           |              |             |
|        |                       |           |              |             |
|        |                       |           |              |             |
|        |                       |           |              |             |
|        |                       |           |              |             |
|        |                       |           |              |             |

| 1日投与順<br>(経時的にプレメディケーション・ホストメディケーション、<br>溶解液まで含む)                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| day1、8<br>①ソルデム 500mL (90分)<br>②ハロノセトロン0.75mgハッグ+デキサート4.95mg※ (15分)<br>③シスプラチン25mg/m <sup>2</sup> +生食500mL (90分)<br>④ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup> +5%糖液100mL (30分)<br>⑤生食50mL (全開で) |
| <内服><br>day1-3,8-10)<br>アプレピタントカプセル(125-80-80)※<br>day1は化学療法開始1時間前、day2,3は朝食後                                                                                                      |
| ※ 制吐薬適正使用ガイドラインよりシスプラチンは高度催吐性リスクに分類されるが、レジメンとしての催吐性リスクは中等度のため、中等度リスクのアプレピタント併用に準じた。                                                                                                |