

レジメン名

GEM

出典 ジェムザール適正使用ガイド2013年2月作成

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	--	-----------------------------

対象疾患

膀胱がん
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

その他				

投与中止の基準

WBC	2000/mm ³ 未満	PLT	7万/mm ³ 未満
その他	投与基準 WBC 4000-12000/mm ³ 、ANC 2000/mm ³ 以上 PLT 10万/mm ³ 以上、Hb 9.5g/dL以上 AST,ALT 100IU/L以下、T-bil 2.4mg/dL以下 BUN 23mg/dL以下、CR 1.08mg/dL以下		

1クール期間 28日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%糖液100mL	30分	d1、8、15

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、溶解液まで含む)

day1、8、15

- ① グラネセロン3mg/バッグ (30min)※
- ② ゲムシタビン1000mg/m² + 5%糖液100mL (30min)
- ③ 生食50mL (フラッシュ用)

※膀胱がんにおいては耐糖能異常をきたしやすいことからデカドロン抜きで登録とする。