

レジメン名

GEM

出典 ジェムザール適正使用ガイド2013年2月作成

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	-----------------------------	-----------------------------

対象疾患

非小細胞肺癌
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発
<input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後)
<input type="checkbox"/>
基本は2nd line以降だが、高齢者やPS不良例はその限りではない。

投与減量の基準

その他			

1クール期間 28日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

WBC	2000/mm3未満	PLT	7万/mm3未満
Cr		BUN	
AST(GOT)		ALT(GPT)	
その他	投与基準 WBC 4000/mm3以上、PLT 10万/mm3以上 Hb 9g/dL以上、AST,ALT 80IU/L以下 T-bil 1.5mg/dL以下、CR 1.5mg/dL以下		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ゲムシタピン	1000mg/m2	5%糖液100mL	30分	d1, 8, 15

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1, 8, 15 ①グラニセトロン3mgバッグ+デキサト6.6mg(15-30min) ②ゲムシタピン1000mg/m2+5%糖液100mL(30min) ③生食50mL(フラッシュ用)