

レジメン名

GEM+CBDCA

出典

J Clin Oncol.2006;24:4699-4707

実施部署区分

☒入院☐外来☐処置

対象疾患

卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌

☒進行・再発☒プラチナ感受性☐☐

投与減量の基準

ANC	500/mm ³ 未満(5日以上)、100/mm ³ 未満(3日以上)		
PLT	2.5万/mm ³ 未満		
その他	その他、発熱性好中球減少症、Grade3以上の非血液毒性にて以下へ減量 ・GEM:1000→800mg/m ² →day8の投与を省略		

投与中止の基準

ANC	1500/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
その他	day8のGEM投与: ・ANC1000~1400/mm ³ で50%量に減量 ・PLT7.5万~9.9万/mm ³ で50%量に減量 上記に満たない場合は投与を省略		

1クール期間 21日

(次のクールまでの標準期間)

総クール数

最大
10クール

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%糖液100mL	30分	d1、8
カルボプラチン	AUC4(GFR+25)	5%糖液250mL	60分	d1

1日投与順 (経時的にプレメディケーション・ポストメディケーション、 溶解液まで含む)
day1 ①アロキシ0.75mg/バッグ+デキサート4.95mg (15min) ②ゲムシタビン1000mg/m ² +5%糖液100mL (30min) ③カルボプラチンAUC4+5%糖液250mL(60min) ④生食50mL(フラッシュ用)
day8 ①デキサート6.6mg+生食100mL(15min) ②ゲムシタビン1000mg/m ² +5%糖液100mL (30min) ③生食50mL(フラッシュ用)
<制吐剤> アプレビタント(day1:125mg、day2-3:80mg)