

レジメン名

HD Ara-C(RT後の地固め療法)

出典

J Clin Oncol 31:3971-3979

実施部署区分

☒入院

☐外来

☐処置

対象疾患

中枢神経原発悪性リンパ腫

☐進行・再発

☐補助療法(術前・術後)

☒初発(R-MPV→RT後の地固め療法)

投与減量の基準

その他			

1クール期間

28日

総クール数

2クール

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

WBC	3000/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
Cr	1.5mg/dL以上	Cor	50mL/min以下
T-bil	2mg/dL以上		
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
シタラビン	2000mg/m ² /回※	輸液500mL	3時間	d1-2
※出典では3000mg/m ² /回だが、リンパ腫に対する添付文書の用量上限値である2000mg/m ² で登録。				

1日投与順

(経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、溶解液まで含む)

day1-2

①グラニセトロン3mg/バッグ＋ソル・メルコート40mg (30min)

②シタラビン2000mg/m²＋輸液500mL (3hr)

③生食50mL (フラッシュ用)

・ステロイド点眼液 1日4回両眼
(Ara-Cによる結膜・角膜炎の発症予防)