

レジメン名

dasatinib

出典 スプリセル添付文書

実施部署区分

<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

対象疾患

フィラデルフィア染色体陽性ALL
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> 初発 <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

ANC	500/mm ³ 未満※	PLT	1万/mm ³ 未満※
その他	※骨髓穿刺を行い、白血病に関連する血球減少の場合は1回90mgを1日2回に増量可能。白血病に関連しない場合はANC 1000/mm ³ 以上及びPlt 2万/mm ³ 以上に回復してから同量で再開。2度目の血球減少時は1回50mgを1日2回、3度目は1回40mgを1日2回まで減量。		

投与中止の基準

その他			

1クール期間 連日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ダサチニブ(スプリセル)	70mg/回 1日2回	経口		連日

1日投与順 (経時的にプレメタキーション・ホストメタキーション、 溶解液まで含む)
スプリセル 140mg 分2