

レジメン名

Ph陽性ALL維持療法

出典 JALSG ALL208

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	-----------------------------	-----------------------------

対象疾患

Ph陽性ALL(15歳以上*)
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input checked="" type="checkbox"/> 初発 <input type="checkbox"/>

* 出典では15歳以上65歳未満だが、田所医師より上記で登録と。

投与減量の基準

その他			

1クール期間 28日

(次のクールまでの標準期間)

総クール数 ※

※寛解到達日から満2年になるまで

投与中止の基準

WBC	3000/mm3未満	ANC	1500/mm3未満
Plt	8万/mm3未満		
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ピンクリスチン(オンコビン)	1.3mg/m ² (上限2mg)	輸液100mL	30分	d1
プレドニン	60mg/m ²	経口		d1-5
イマチニブ	600mg/body	経口		d1-28

1日投与順 (経時的にプレメタキーション・ホストメタキーション、 溶解液まで含む)
day1 ①生食50mL(ルート確保用) ②オンコビン1.3mg/m ² +輸液100mL(30min) ③生食50mL(フラッシュ用)
day1-5 ①プレドニン60mg/m ² (経口)
day1-28 ①イマチニブ600mg/body(経口)