

レジメン名

Ph陽性ALL地固め療法(G2)

出典 JALSG ALL208

実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

Ph陽性ALL(15歳以上*)

進行・再発
補助療法(術前・術後)
初発

* 出典では15歳以上65歳未満だが、田所医師より上記で登録と。

投与減量の基準

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| その他 | | | |

投与中止の基準

| | | | |
|-----|------------|-----|------------|
| WBC | 3000/mm3未満 | ANC | 1000/mm3未満 |
| Plt | 8万/mm3未満 | | |
| その他 | | | |

1クール期間 28日

総クール数 2,4,6,8
クール目

(次のクールまでの標準期間)

| 薬剤名・略号 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与速度(時間) | 投与日(d1、d8等) |
|-------------------|---------------------|---------|----------|-------------|
| メトレキサート(メソトレキサート) | 15mg/body | 髄注 | | d1 |
| シタラビン(キロサイド) | 40mg/body | 髄注 | | d1 |
| デキサメタゾン | 3.3mg/body | 髄注 | | d1 |
| シクロホスファミド(エンドキサン) | 1200mg/m2 | 輸液500mL | 3時間 | d1 |
| ダウノルピシン(ダウノマイシン) | 60mg/m2 | 輸液100mL | 30分 | d1 |
| ピンクリスチン(オンコビン) | 1.3mg/m2 (上限2mg) | 輸液100mL | 30分 | d1 |
| プレドニゾン | 60mg/m2 | 経口 | | d1-7 |
| イマチニブ | 600mg/body | 経口 | | d2-21 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1日投与順
 (経時的にプレメタキーション・ホストメタキーション、
 溶解液まで含む)

 day1
 ①メトレキサート15mg+生食2-6mL(髄注)
 ②キロサイド40mg(髄注)
 ③デキサート3.3mg(髄注)

 day1
 ①グラネセロン3mgバッグ(15-30min)
 ②ダウノマイシン60mg/m2+輸液100mL(30min)
 ③オンコビン1.3mg/m2+輸液100mL(30min)
 ④エンドキサン1200mg/m2+輸液500mL(3hr)
 ⑤生食50mL(フラッシュ用)

 day1-7
 ①プレドニン60mg/m2(経口)

 day2-21
 ①イマチニブ600mg/body(経口)