レジメン名

MTX＋5-FU

出典　メソトレキセート添付文書

実施部署区分

■入院　■外来　□処置

対象疾患

胃癌

■進行・再発
□補助療法（術前・術後）
□
□

投与減量の基準

その他			

サイクル内休薬基準

その他			

1コース期間　7日
（次のコースまでの標準期間）

総コース数　PDまで

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度（時間）	投与日(d1、d8等)
メトトレキサート（メソトレキセート）	100mg/m^2	生食50mL	全開	day1
5-FU	600mg/m^2	生食50mL	全開	day1

1日投与順
（経時的にﾌﾟﾚﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ・ﾎﾟｽﾄﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ、溶解液まで含む）

day1
①ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ3mg　（15分）

②ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ　250mg＋生食50mL（全開）

③ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ　100mg/m^2＋生食50mL（全開）

④メイロン　40mL＋生食500mL（3時間）

⑤5-FU　600mg/m^2＋生食50mL（全開）

⑥生食50mL（フラッシュ用）

day2-3
メソトレキセート投与後24時間目よりロイコボリン　1回 15mgを6時間間隔で6回投与