

レジメン名 NDP+DTX

出典 Lancet Oncol 2015;16:1630-38

実施部署区分

入院     外来     処置

対象疾患 扁平上皮肺癌  
 進行・再発  
 補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

ANC	500/mm3未満※	PLT	2.5万/mm3未満※
Cr	1.5mg/dL以上*		
その他	※DTXを10mg/m <sup>2</sup> 減量する *NDPを25mg/m <sup>2</sup> 減量する		

1クール期間 21日      総クール数 4-6クール  
(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

ANC	1500/mm3未満	PLT	10万/mm3未満
Hb	9.0g/dL未満	CLcr	60mL/min未満
AST,ALT	100IU/L以上	T-bil	2g/dL以上
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	NS250mL	60分	d1
ネダプラチン(アクブラ)	100mg/m <sup>2</sup>	NS500mL	90分	d1

**1日投与順**  
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、溶解液まで含む)

day1  
①アロキシシ0.75mg+デキサート6.6mg+(15min)  
②ドセタキセル60mg/m<sup>2</sup>+生食250mL(60min)  
③アクブラ100mg/m<sup>2</sup>+生食500mL(90min)  
④生食500mL(90min)  
⑤輸液500mL(ハイドレーション用 90min)  
<内服>  
day2,3  
デカロン4mg 2錠 分2