

レジメン名

Nivolumab(q2w)

出典 オブジーボ適正使用ガイド2020年10月作成
ONO-4538-12試験

実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

がん化学療法後に増悪した
治療切除不能な進行・再発胃癌
進行・再発
補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

AST	120IU/L以上	ALT	120IU/L以上
T-bil	1.8mg/dL以上	Cr	1.6mg/dL以上
その他	Grade1以上の肺臓炎、 Grade2以上の下痢・大腸炎・神経毒性・心筋炎、 Grade3以上の発疹、 症候性の甲状腺機能低下症・甲状腺中毒・下垂体 障害・副腎障害、1型糖尿病		

1クール期間 14日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ニボルマブ(オブジーボ)	240mg/body	輸液100mL	30分	day1

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、
溶解液まで含む)

- day1
- ①生食50mL(ルート確保用)
 - ②オブジーボ240mg/body+輸液100mL
インラインフィルターを用いて投与 (30分)
 - ③生食50mL(フラッシュ用)