

レジメン名

Nivolumab(q4w)

出典

オブジーボ適正使用ガイド単剤療法版2022年7月作成
CheckMate -274試験(ONO-4538-33)

実施部署区分

☒入院 ☐外来 ☐処置

対象疾患

尿路上皮癌

☐進行・再発
☒補助療法(術後)
☐
☐

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

AST	120IU/Lを超える	ALT	120IU/Lを超える
T-bil	1.8mg/dLを超える		
Cr	6.48(女性は4.8)mg/dLを超えるかつベースライン値の1.5倍超		
その他	Grade1以上の肺臓炎、 Grade2以上の下痢・大腸炎・神経毒性・心筋炎、 Grade3以上の発疹、 症候性の甲状腺機能低下症・甲状腺中毒・下垂体障害・副腎障害、1型糖尿病、副腎クリーゼの疑い		

1クール期間 28日

総クール数 12ヶ月間

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ニボルマブ(オブジーボ)	480mg/body	輸液100mL	30分	day1

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、
溶解液まで含む)

day1

①生食50mL(ルート確保用)

②オブジーボ480mg/body+輸液100mL(30分)

インラインフィルターを用いて投与

③生食50mL(フラッシュ用)