レジメン名

Nivolumab(q4w)

出典　オプジーボ適正使用ガイド2020年10月作成
ONO-4538-12試験

実施部署区分

■入院　■外来　□処置

対象疾患

がん化学療法後に増悪した
治癒切除不能な進行・再発胃癌

■進行・再発
□補助療法(術前・術後)
□
□

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

AST	120IU/L以上	ALT	120IU/L以上
T-bil	1.8mg/dL以上	Cr	1.6mg/dL以上
その他	Grade1以上の肺臓炎、 Grade2以上の下痢・大腸炎・神経毒性・心筋炎、 Grade3以上の発疹、 症候性の甲状腺機能低下症・甲状腺中毒・下垂体障害・副腎障害、1型糖尿病		

1クール期間　28日
(次のクールまでの標準期間)

総クール数　PDまで

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ニボルマブ(オプジーボ)	480mg/body	輸液100mL	30分	day1

1日投与順
(経時的にﾌﾟﾚﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ・ﾎﾟｽﾄﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ、溶解液まで含む)

day1
①生食50mL(ルート確保用)

②オプジーボ480mg/body＋輸液100mL
インラインフィルターを用いて投与　(30分)

③生食50mL(フラッシュ用)