

レジメン名

Pembrolizumab(q6w)

出典 KEYNOTE-564

実施部署区分

☒入院 ☒外来 ☐処置

対象疾患

腎細胞癌

☐進行・再発
☒補助療法(術前・術後)
☐
☐

1クール期間 42日 総クール数 12か月まで
(次のクールまでの標準期間)

投与減量の基準

infusion reaction	Grade2: 直ちに中止し、1時間以内に回復する場合には投与速度を50%に減速して再開
-------------------	--

投与中止の基準

AST	120IU/L以上	ALT	120IU/L以上
T-bil	1.8mg/dL以上		
SCr	男性: 1.62mg/dLを超える、女性: 1.2mg/dLを超える		
その他	Grade2以上の肺臓炎・大腸炎・下痢・下垂体炎、Grade3以上の高血糖・甲状腺機能障害・心筋炎・脳炎・ギランバレー症候群、症候性の内分泌障害(甲状腺機能低下症を除く)、1型糖尿病、Grade3以上または再発性のGrade2のinfusion reaction		
	Grade4または再発性のGrade3の副作用、副作用の処置として副腎皮質ホルモン剤をプレドニゾン換算で10mg/日相当量以下まで12週間以内に減量できない場合、12週間を超える休薬後もGrade1以下まで回復しない場合		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	400mg	輸液100mL	30分	day1

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、溶解液まで含む)

day1
① 生食50mL (ルート確保用)
② キイトルーダ400mg＋輸液100mL(30分)
※インラインフィルター(0.2～5 μ m)を使用して投与。
③ 生食50mL(フラッシュ用)