

レジメン名

Pembrolizumab(q3w)

出典 NEJM 2016;375:1823-1833  
キイトルーダ適正使用ガイド

実施部署区分

入院    外来    処置

対象疾患

PD-L1陽性の切除不能な  
進行・再発の非小細胞肺癌

進行・再発  
補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

infusion reaction	Grade2:直ちに中止し、1時間以内に回復する場合には投与速度を50%に減速して再開
-------------------	---

投与中止の基準

AST	120IU/L以上	ALT	120IU/L以上
T-bil	1.8mg/dL以上	Cr	1.6mg/dL以上
その他	Grade2以上の肺炎・大腸炎・下垂体炎、Grade3以上の高血糖・甲状腺機能障害・心筋炎・脳炎・ギランバレー症候群、症候性の内分泌障害(甲状腺機能低下症を除く)、1型糖尿病、Grade3以上または再発性のGrade2のinfusion reaction、Grade4または再発性のGrade3の副作用、副作用の処置として副腎皮質ホルモン剤をプレドニゾン換算で10mg/日相当量以下まで12週間以内に減量できない場合、12週間を超える休薬後もGrade1以下まで回復しない場合		

1クール期間

総クール数

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	200mg	輸液100mL	30分	day1

**1日投与順**  
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、溶解液まで含む)

day1  
①生食50mL (ルート確保用)

②キイトルーダ200mg+輸液100mL(30分)  
※インラインフィルター(0.2~5μm)を使用し  
て投与。

③生食50mL(フラッシュ用)