

レジメン名

Pembrolizumab(q6w)

出典 キイトルーダ適正使用ガイド2023年12月作成

実施部署区分

■入院 ■外来 □処置

対象疾患

がん化学療法後に増悪したTMB-Highを有する進行・再発の固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)
■進行・再発
□補助療法(術前・術後)
□
□

投与減量の基準

infusion reaction Grade2:直ちに中止し、1時間以内に回復する場合には投与速度を50%に減速して再開

投与中止の基準

Table with 4 columns: AST, T-bil, ALT, Cr and 120IU/L以上, 1.8mg/dL以上, 1.6mg/dL以上. Includes text for 'その他' regarding infusion reactions and other conditions.

1クール期間 42日 (次のクールまでの標準期間)

総クール数 PDまで

Table with 5 columns: 薬剤名・略号, 1日投与量, 投与方法, 投与速度(時間), 投与日(d1, d8等). Row 1: ペムブロリズマブ(キイトルーダ), 400mg, 輸液100mL, 30分, day1.

Table with 1 column: 1日投与順 (経時的にプレミキーション・ポストミキーション、溶解液まで含む). Includes instructions for day 1: ①生食50mL (ルート確保用), ②キイトルーダ400mg+輸液100mL(30分) ※インラインフィルター(0.2~5µm)を使用し投与, ③生食50mL(フラッシュ用).