

レジメン名

S-1+CDDP

出典 TS-1適正使用ガイド2012年10月改訂

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

胃がん

進行・再発
 補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

WBC	3500/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
CLcr	80mL/min未満	T-bil	1.8mg/dL以上
AST(GOT)	100IU/L以上	ALT(GPT)	100IU/L以上
その他	ANC 2000/mm ³ 未満 上記のいずれかを満たす場合、S-1を1段階減量を考慮。 CLcrが60mL/min未満のとき、CDDPを50%減量。		

投与中止の基準

WBC	2000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満
CLcr	50mL/min未満	T-bil	3mg/dL以上
AST(GOT)	150IU/L以上	ALT(GPT)	150IU/L以上
その他	ANC 1000/mm ³ 未満		

1クール期間 35日

総クール数 6クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ティーエスワン	80mg/m ² *	朝、夕食後		d1 夕-22朝
シスプラチン	60mg/m ²	NS500mL	2時間以上	d8
	※体表面積ごとで初回基準量を決める 1.25m ² 未満: 40mg/回 1.25m ² 以上~1.5m ² 未満: 50mg/回 1.5m ² 以上: 60mg/回			

1日投与順 (経時的にプレドニゾン・ホストメドニゾン、 溶解液まで含む)
day8 ①アロキシ0.75mg/kg+デキサート13.2mg (15分)※ ②硫酸マグネシウム20mL+ソルテム3A 200mL (45分) ③マンニトT15% 250mL (30分) ④シスプラチン 60mg/m ² +生食(500)400mL (2時間) ⑤マンニトT15% 250mL (30分) ⑥ソルテム3A 500mL+プロセド 20mg (2時間) ⑦ソルテム3A 500mL (2時間) ⑧ソルテム3A 500mL (2時間) ⑨ソルテム3A 500mL (2時間)
※アプレピタントを使用する場合にはデキサートを6.6mgに減量する。