

レジメン名

TS-1

出典 TS-1適正使用ガイド2012年10月改訂

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	--	-----------------------------

対象疾患

隣がん
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input checked="" type="checkbox"/> 初発 <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

WBC	3500/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
CLcr	60mL/min未満	T-bil	1.8mg/dL以上
AST(GOT)	100IU/L以上	ALT(GPT)	100IU/L以上
その他	ANC 2000/mm ³ 未満、Hb 9.0g/dL未満		

1クール期間 42日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

WBC	2000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満
CLcr	30mL/min未満	T-bil	3mg/dL以上
AST(GOT)	150IU/L以上	ALT(GPT)	150IU/L以上
その他	WBC 12000/mm ³ 以上 ANC 1000/mm ³ 未満 Hb 8.0g/dL未満		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ティーエスワン	80mg/m ² **	朝、夕食後		d1-28
	※体表面積ごとで初回基準量を決める 1.25m ² 未満:40mg/回 1.25m ² 以上~1.5m ² 未満:50mg/回 1.5m ² 以上:60mg/回			

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1~28 ①TS-1 80mg/m ² 分2 朝夕食後