

レジメン名 TS-1

出典 TS-1適正使用ガイド2012年10月改訂

実施部署区分

入院    外来    処置

対象疾患 胃がん  
 進行・再発  
 補助療法(術前・術後)  
 初発

投与減量の基準

CLcr	60mL/min未満		
その他			

1クール期間 42日      総クール数 8コース  
(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

WBC	2000/mm <sup>3</sup> 未満	PLT	7.5万/mm <sup>3</sup> 未満
CLcr	30mL/min未満	T-bil	3mg/dL以上
AST(GOT)	150IU/L以上	ALT(GPT)	150IU/L以上
その他	WBC 12000/mm <sup>3</sup> 以上 Hb 8.0g/dL未満		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ティーエスワン	80mg/m <sup>2</sup> **	朝、夕食後		day1-28
	※体表面積ごとで初回基準量を決める 1.25m <sup>2</sup> 未満:40mg/回 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満:50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上:60mg/回			

1日投与順 (経時的にプレメーション・ポストメーション、 溶解液まで含む)
day1~28 ①TS-1 80mg/m <sup>2</sup> 分2 朝夕食後