

## 胆道がん

レジメン名	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
GEM	ゲムシタビン(GEM)	注射	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	
S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム(S-1)	内服	80mg/m <sup>2</sup> /日(分2)	day1-28	42日	1.25m <sup>2</sup> 未満:40mg/回を1日2回 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満:50mg/回を1日2回 1.5m <sup>2</sup> 以上:60mg/回を1日2回
GEM+CDDP	ゲムシタビン(GEM) シスプラチン(CDDP)	注射 注射	1000mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup>	day1,8 day1,8	21日	
GCS	ゲムシタビン(GEM) シスプラチン(CDDP) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム(S-1)	注射 注射 内服	1000mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> /日(分2)	day1 day1 day1-7	14日	S-1: 1.25m <sup>2</sup> 未満:40mg/回を1日2回 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満:50mg/回を1日2回 1.5m <sup>2</sup> 以上:60mg/回を1日2回