

レジメン名

ACR+Ara-C
-----------

出典 JALSG AML201

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	-----------------------------	-----------------------------

対象疾患

AML地固め療法3コース目(CBF(-))
<input type="checkbox"/> 進行・再発
<input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後)
<input checked="" type="checkbox"/> 初発
<input type="checkbox"/>

投与減量の基準

その他			

1クール期間

総クール数

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
アクリルピシン(アクリシノン)	20mg/m <sup>2</sup>	輸液100mL	30分	d1-5
シタラビン(キロサイド)	200mg/m <sup>2</sup>	輸液1000mL	24時間	d1-5

1日投与順 (経時的にプレドニゾン・ポストドニゾン、 溶解液まで含む)
day1~5
①(側管)グラニセトロンバッグ3mg(15-30min)
②アクリシノン20mg/m <sup>2</sup> +輸液100mL(30min)
③生食50mL フラッシュ用
①生食50mL ルート確保用(day1のみ)
②キロサイド200mg/m <sup>2</sup> +輸液1000mL(24hr)
③生食50mL フラッシュ用(day6のみ)