

レジメン名

(患者限定レジメン)AV

出典 J Cancer Res Clin Oncol(2007) 133:547-553

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

AML(60歳以上のPS不良、合併症例)
 ■進行・再発
補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

その他			

1クール期間 28日
(次のクールまでの標準期間)

総クール数 4クール

投与中止の基準

T-bil	2.4mg/dL以上	Ccr	50mL/min未満
その他	※LVEF<40%の患者は対象外		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
シタラピン(キロサイド)	20mg/body/日	輸液 250-500mL	24時間	day1-10(+day11-14)*
エトポシド	50mg/body/日	輸液 250-500mL	24時間	day1-10(+day11-14)*

※day10に骨髓低形成または芽球5%未満を達成しない場合、4日間(day11-14)追加。

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、溶解液まで含む)

day1-10(+day11-14)

①生食50mL(ルート確保・フラッシュ用)

①エトポシド50mg+キロサイド20mg+輸液500mL(24hr)

DEHPフリーの点滴セットを用いて投与

②生食50mL(フラッシュ用)**

※※day11(or day15)に投与