

レジメン名 CA

出典 Int J Hematol.2005;82:48-54.  
Journal of Hematol.&Oncol. 2011;4:46

実施部署区分

入院    外来    処置

対象疾患 AML

進行・再発  
補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

その他			

1クール期間 28日      総クール数 1クール  
(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
シタラビン(キロサイド)	10mg/m <sup>2</sup> /回を2回/日	皮下注射		day1-14
アクリルピシン(アクリシノン)	14mg/m <sup>2</sup> ※	輸液100mL	30分	day1-4、(+day8-10)
※70歳以上ではアクリルピシンを10mg/m <sup>2</sup> に減量する。				

1日投与順 (経時的にプレメーション・ポストメーション、 溶解液まで含む)
day1-4 ①グラニセトロンバッグ3mg(15-30min) ②アクリシノン14mg/m <sup>2</sup> +輸液100mL(30min) ③キロサイド10mg/m <sup>2</sup> (皮下注射)を12時間毎 ④生食50mL(フラッシュ用)
day5-14 ①キロサイド10mg/m <sup>2</sup> (皮下注射)を12時間毎