

レジメン名

IDA+Ara-C

出典 JALSG AML201

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	-----------------------------	-----------------------------

対象疾患

AML寛解導入療法 (M6)
<input type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法 (術前・術後) <input checked="" type="checkbox"/> 初発 <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

その他			

1クール期間

総クール数

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
イダルビシン(イダマイシン)	12mg/m ²	AGOML/V/C/JP 解 輸液適量で 100ml	30分	d1-3
シタラビン(キロサイド)	100mg/m ²	輸液1000mL	24時間	d1-7

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1~3 ① (側管) グラニセトロンバッグ3mg (15-30min) ② イダマイシン12mg/m ² + 注射用水5mL/V + 輸液適量 (30min) ③ 生食50mL フラッシュ用 ① 生食50mL ルート確保用 (day1のみ) ② キロサイド100mg/m ² + 輸液1000mL (24hr)
day4~7 ① キロサイド100mg/m ² + 輸液1000mL (24hr) ② 生食50mL フラッシュ用 (day8のみ)