レジメン名

MEC寛解導入療法

出典　J Clin Oncol 9:1210-1214
Leukemia 3:112-114,1989

実施部署区分

■入院　□外来　□処置

対象疾患

AML

■進行・再発
□補助療法（術前・術後）
□
□

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

その他			

1クール期間　28日
（次のクールまでの標準期間）

総クール数　1クール

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度（時間）	投与日(d1、d8等)
エトポシド	80mg/m2	輸液500mL	3時間	d1-6
シタラビン（キロサイド）	1000mg/m2	輸液500mL	6時間	d1-6
ミトキサントロン（ノバントロン）	6mg/m2	輸液100mL	30分	d1-6

1日投与順
（経時的にﾌﾟﾚﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ・ﾎﾟｽﾄﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ、溶解液まで含む）

day1-6
①ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3mgﾊﾞｯｸﾞ＋ｻｸｼｿﾞﾝ100mg（30min）
②エトポシド80mg/m2＋輸液500mL(3hr)
　DEHPフリーの点滴セットを用いて投与
③ｷﾛｻｲﾄﾞ1000mg/m2＋輸液500mL（6hr）
④生食50mL（フラッシュ用）

ｷﾛｻｲﾄﾞ投与終了後3時間あけてﾉﾊﾞﾝﾄﾛﾝ投与

⑤生食50mL　ルート確保用
⑥ﾉﾊﾞﾝﾄﾛﾝ6mg/m2＋輸液100mL（30min）
⑦生食50mL（フラッシュ用）