

レジメン名

MEC地固め療法

出典 J Clin Oncol 9:1210-1214
Leukemia 3:112-114,1989

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	-----------------------------	-----------------------------

対象疾患

AML
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

その他			

1クール期間

総クール数

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
エトポシド	80mg/m ²	輸液500mL	3時間	d1-4
シタラビン(キロサイド)	1000mg/m ²	輸液500mL	6時間	d1-4
ミトキサントロン(ノバントロン)	6mg/m ²	輸液100mL	30分	d1-4

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1-4 ①グラニセトロン3mgハック+サクゾン100mg (30min) ②エトポシド80mg/m ² +輸液500mL(3hr) DEHPフリーの点滴セットを用いて投与 ③キロサイド1000mg/m ² +輸液500mL(6hr) ④生食50mL(フラッシュ用) キロサイド投与終了後3時間あけてノバントロン投与 ⑤生食50mL ルート確保用 ⑥ノバントロン6mg/m ² +輸液100mL(30min) ⑦生食50mL(フラッシュ用)