

レジメン名

MIT+Ara-C(地固め療法 第1コース)

出典 JALSG APL 204試験

実施部署区分

☒入院 ☐外来 ☐処置

対象疾患

急性前骨髄性白血病

☐進行・再発
☐補助療法(術前・術後)
☒初発
☐

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

WBC	3,000/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
ANC	1,500/mm ³ 未満	AST/ALT	200IU/L以上
その他			

1クール期間 28日

総クール数 1クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ミトキサントロン(ノバントロン)	7mg/m ²	NS100mL	30分	d1-3
シタラビン	200mg/m ²	輸液1000mL	24時間	d1-5

1日投与順 (経時的にプレメディケーション・ポストメディケーション、 溶解液まで含む)
day1 (側管) ①グラニセトロンバッグ3mg(15-30min) ②ノバントロン7mg/m ² +生食100mL(30min) ③生食50mL フラッシュ用 (メイン) ①生食50mL ルート確保用 ②シタラビン200mg/m ² +輸液1000mL(24hr)
day2-3 (側管) ①グラニセトロンバッグ3mg(15-30min) ②ノバントロン7mg/m ² +生食100mL(30min) ③生食50mL フラッシュ用 (メイン) ①シタラビン200mg/m ² +輸液1000mL(24hr)
day4-5 (メイン) ①シタラビン200mg/m ² +輸液1000mL(24hr)
day6 (メイン) ①生食50mL フラッシュ用