

レジメン名

APL地固め療法ATRA+ATO

出典 N Engl J Med 369(2013)111-21  
APL0406試験

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

急性前骨髄性白血病  
進行・再発  
補助療法(術前・術後)  
初発

投与減量の基準

WBC	3万/mm <sup>3</sup> を超える		
その他			

投与中止の基準

WBC	3万/mm <sup>3</sup> を超える	Cr	3.0mg/dL以上
T-bil	3.0mg/dL以上		
その他			

1クール期間 56日間

総クール数 4クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
<1-3クール目>				
ATRA(ベサノイド)	45mg/m <sup>2</sup>	経口	分3(食後)	d1-14、d29-42
ATO(トリセノックス)	0.15mg/kg	NSまたは5%ブドウ糖液100-250mL	1-2時間	d1-5、d8-12、d15-19、d22-26
<4クール目>				
ATRA(ベサノイド)	45mg/m <sup>2</sup>	経口	分3(食後)	d1-14
ATO(トリセノックス)	0.15mg/kg	NSまたは5%ブドウ糖液100-250mL	1-2時間	d1-5、d8-12、d15-19、d22-26

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、 溶解液まで含む)
d1-5、d8-12、d15-19、d22-26 ①グラニセトロン3mg/バッグ(15-30min) ②トリセノックス0.15mg/kg+生食または5%ブドウ糖液100-250mL(1-2hr) ③生食50mL(フラッシュ用)
<1-3クール目> d1-14、d29-42 ベサノイドは分3で食後に内服
<4クール目> d1-14 ベサノイドは分3で食後に内服