

レジメン名

ATRA+IDA(地固め療法 1コース目)
Low/intermediate risk

出典 Blood. 2010;116(17):3171-3179
ベサノイドカプセル添付文書2018年6月改訂

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

急性前骨髄性白血病
進行・再発
補助療法(術前・術後)
初発

投与減量の基準

WBC	3万/mm ³ を超える		
その他			

1クール期間
(次のクールまでの標準期間)

総クール数

投与中止の基準

WBC	3万/mm ³ を超える	Cr	3.0mg/dL以上
T-bil	3.0mg/dL以上	LVEF	50%未満
その他	APL分化症候群が疑われる症状 偽性脳腫瘍 ※T-bil、CrはATRA+ATO療法のレジメンを参考		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ATRA(ベサノイド)	45mg/m ²	経口	分3(食後)	d1-15
イダルビシン(イダマイシン)	5mg/m ²	AQ5mL/Vで溶解 輸液適量で 100mL	30分	d1-4

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、 溶解液まで含む)
d1-15 ベサノイド45mg/m ² 分3(食後) d1-4 ①グラニセロン3mg/バッグ(15-30min) ②イダマイシン5mg/m ² +注射用水5mL/V+ 輸液適量(30min) ③生食50mL(フラッシュ用)