

レジメン名

GEM

出典 ジェムザール適正使用ガイド2013年2月作成

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	--	-----------------------------

対象疾患

胆道がん
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

WBC	2000/mm ³ 未満	PLT	7万/mm ³ 未満
その他	<small>投与基準</small> WBC 4000/mm ³ 以上、ANC 2000/mm ³ 以上 PLT 10万/mm ³ 以上、Hb 10g/dL以上 AST,ALT 100IU/L以下、T-bil 2.4mg/dL以下 CR 1.08mg/dL以下		

1クール期間 28日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ゲムシタピン	1000mg/m ²	5%糖液100mL	30分	d1、8、15

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1、8、15 ① グラニセトロン3mgハック(30分) ② ゲムシタピン1000mg/m ² +5%糖液100mL(30分) ③ 生食50mL(フラッシュ用)