

レジメン名 TS-1

出典 TS-1適正使用ガイド2012年10月改訂

実施部署区分

入院    外来    処置

対象疾患 胆道がん

進行・再発  
補助療法(術前・術後)  
初発

投与減量の基準

WBC	3500/mm <sup>3</sup> 未満	PLT	10万/mm <sup>3</sup> 未満
CLcr	60mL/min未満	T-bil	1.8mg/dL以上
AST(GOT)	100IU/L以上	ALT(GPT)	100IU/L以上
その他	ANC 2000/mm <sup>3</sup> 未満、Hb 9.0g/dL未満		

1クール期間 42日                      総クール数 PDまで  
(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

WBC	2000/mm <sup>3</sup> 未満	PLT	7.5万/mm <sup>3</sup> 未満
CLcr	30mL/min未満	T-bil	3mg/dL以上
AST(GOT)	150IU/L以上	ALT(GPT)	150IU/L以上
その他	WBC 12000/mm <sup>3</sup> 以上 ANC 1000/mm <sup>3</sup> 未満 Hb 8.0g/dL未満		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ティーエスワン	80mg/m <sup>2</sup> **	朝、夕食後		d1-28
	※体表面積ごとで初回基準量を決める			
	1.25m <sup>2</sup> 未満:40mg/回			
	1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満:50mg/回			
	1.5m <sup>2</sup> 以上:60mg/回			

**1日投与順**  
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、  
溶解液まで含む)

day1~28  
①TS-1 80mg/m<sup>2</sup> 分2 朝夕食後