

レジメン名

**GEM+CDDP療法**

出典 N Engl J Med 2010;362:1273-1281  
Br J Cancer 2010; 103:469-474  
ジェムザール適正使用ガイド

実施部署区分

入院    外来    処置

対象疾患

**胆道がん**
  
 進行・再発
   
 補助療法(術前・術後)

項目	ゲムシタピン	シスプラチン
グレード4 (500/mm <sup>3</sup> 未満) の好中球数減少	1000-800mg/m <sup>2</sup>	変更なし
2万/mm <sup>3</sup> 未満の血小板数減少または血小板輸血の実施	1000-800mg/m <sup>2</sup>	変更なし
実施医療機関の基準値上限の10倍を超えるAST (GOT) / ALT (GPT) 上昇	1000-800mg/m <sup>2</sup>	変更なし
実施医療機関の基準値上限の1.5倍を超える血清クレアチニン上昇	変更なし	休薬

1クール期間 21日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	NS500mL	90分	day1、8
ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	5%糖液100mL	30分	day1、8

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1、8
①ソルデム 500mL (90分)
②アロキソ0.75mg/kg + テキサト6.6mg (15分)
③シスプラチン25mg/m <sup>2</sup> + 生食500mL (90分)
④ゲムシタピン1000mg/m <sup>2</sup> + 5%糖液100mL (30分)
⑤生食50mL (全開で)
<前投薬> アプレピタントカプセル適宜投与